

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D'ANGERS

Année 1971

N° 2

THÈSE

pour le

DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'État)

par

PHILIPPE GIRARD

né le 4 Septembre 1940 à ANGERS (49)

Présentée et soutenue publiquement le : 10 FEV. 1971

Les Syndromes de Carence en Immunoglobulines
à Activité Anticorps

(A propos de 55 Observations)

Président : Monsieur le Professeur MÉNARD

FACULTE MIXTE DE MEDECINE
ET DE PHARMACIE D'ANGERS

- - - - -

ANNEE

N°

T H E S E
pour le
DOCTORAT EN MEDECINE
(Diplôme d'Etat)

Par

Philippe GIRARD

né le 4 Septembre 1940 à ANGERS (49)

- - - - -

Présentée et soutenue publiquement le:

LES SYNDROMES DE CARENCE EN IMMUNOGLOBULINES

A ACTIVITE ANTICORPS.

A propos de 55 Observations.

PRESIDENT: Monsieur le PROFESSEUR MENARD.



F A C U L T E M I X T E
D E M E D E C I N E et de P H A R M A C I E d' A N G E R S

- - - - -

Doyen..... Mr J.C. RENIER

Assesseur.....Mr H.GERMAIN

- - - - -

Doyen Honoraire : Mr R.ROUCHY

Professeurs Honoraires : Mr AMSLER
Mr DAVID
Mr ROUSSEAU
Mr HY

- - - - -

PROFESSEURS TITULAIRES

M.M.	COTTIN	Chimie Générale
	DELAITRE	Clinique Médicale Infantile
	DESJOBERT	Pharmacie Chimique
	FRESSINAUD	Clinique Médicale B
	GERMAIN	Botanique et Cryptogamie
	GOYER	Clin.Chirurgicale B
	GUERIN	Biophysique Médicale
	GUNTZ	Anatomie
	HERISSET	Matière Médicale
	HERMANN	Clin. Ophtalmologique
	JOLIVET	Chimie Analytique
	LAFARGUE	Pharmacie Galénique
	MARTIN	Pathologie Chirurgicale
	MENARD	Hygiène et Méd.Sociale
	NAULLEAU	Clin.Chirurgicale A
	OURY	Clin.Pneumo-Phtisiologique
	PERREAU	Clin.Médicale A
	REBEL	Histologie
	RENIER	Clin. Rhumatologique
	ROUCHY	Clin.Gynécologique et Obstétricale
	SIMARD	Anatomie Pathologique

PROFESSEUR TITULAIRE A TITRE PERSONNEL

HOCQUET

Parasitologie



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41545912_0024

PROFESSEURS SANS CHAIRE

M.M.	PARSY	O.R.L.
	PERTUS	Urologie
	ROGNON	Chirurgie Générale

AGREGES

GODLEWSKI	Neurologie
TESTARD	Pédiatrie

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES

ALAIN	Pharmacologie
AUGEREAU	Pharmacodynamie
BONNIOT	Clin.Médicale B
CAVELLAT Mme	Anesthésie-Réanimation
CAVELLAT	Anesthésie-Réanimation
CARON	Electroradiologie
COULLAUD	Physiologie
DESNOS	O.R.L.
EMILE	Neurologie
FRESNEAU	Médecine Interne
GIRAULT	Biochimie Médicale
GROSIEUX	Gynécologie-Obstétrique
HUREZ	Hématologie-Immunologie
HUYGHUES-	
DESPOINTES	Biochimie Médicale
JOUBAUD	Méd.Gén. et Expérimentale
LARGET-PIET	Pédiatrie Génétique
PILLET	Anatomie
PILLOT	Bactériologie
PLANE	Chirurgie Générale
PRELOT Melle	Physiologie-Zoologie
SCHNITZLER Mme	Dermato-Vénérologie
QUERO Melle	Microbiologie
TADEI	Méd.Générale et Cardiologie

DELEGUES DANS LES FONCTIONS DE MAITRES DE CONFERENCES

LARRA	Histologie
MARTIN FRERE	Chimie Générale et Minérale
RIBERI	Médecine Interne
THUILLIER	Chimie Biologique
WALTON	Médecine Légale
WARTEL	Psychiatrie

Par délibération en date du 28 Janvier
1966, la Faculté a arrêté que les opinions émises dans les
dissertations qui lui seront présentées doivent être consi-
dérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend
leur donner aucune approbation ni improbation.

A MES PARENTS

A MES BEAUX - PARENTS

A MA FEMME

A MON FILS

En témoignage de mon affection.

- - - - -

A Monsieur le Professeur MENARD,
Chef de Service d'ALLERGOLOGIE
Titulaire de la Chaire d'hygiène
et de médecine Sociale
Médecin des Hopitaux.

Qui nous a fait l'honneur d'accepter la présidence de cette thèse,

Qu'Il trouve ici l'expression de
notre très respectueuse reconnaissance.

A Monsieur le Professeur OURY,
Professeur de Clinique Pneumo-
Phtisiologique,
Médecin des Hopitaux.

Qui nous a fait l'honneur d'être
notre juge,

Nous lui exprimons, avec notre
profond respect, nos plus vifs
remerciements.

A Monsieur le Professeur COULLAUD,
Maitre de conférences Agrégé de Physiologie
Biologiste des Hopitaux.

Qui nous a fait l'honneur d'accepter de faire partie de notre jury.

Qu'il trouve ici le témoignage de notre gratitude et de notre respect.

A Monsieur le Docteur BONHOMME
Chargé de Cours dans la
Chaire de Thérapeutique,
Médecin des Hopitaux,
Chef du service de Réanimation
et de Toxicologie Clinique.

Qui nous a fait l'honneur d'accepter d'être notre juge.

Nous l'assurons de notre reconnaissance et de notre respect.

A Monsieur le Docteur SABBAB,
Chef de clinique Assistant du
Service d'ALLERGOLOGIE.

Qui nous a inspiré le sujet de
cette thèse et aidé dans sa ré-
alisation.

Nous l'assurons de notre recon-
naissance.

TABLE DES MATIERES.

- AVANT PROPOS.....	I
- INTRODUCTION...	
CHAPITRE I	
- LES IMMUNOGLOBULINES A ACTIVITE ANTICORPS.....	4
CHAPITRE II	
- LES DEFICITS EN ANTICORPS.....	14
I - Les déficits immunitaires primitifs.....	16
II - Les déficits immunitaires secondaires.....	25
- PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE	
I - METHODES EXPLORANT LES DEFICITS HUMORAUX.....	29
II - METHODES EXPLORANT LES DEFICITS CELLULAIRES.....	34
III - METHODES COMPLEMENTAIRES.....	36
IV - CONDUITE PRATIQUE DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE.....	38
- NOTRE ETUDE PERSONNELLE.....	41
I - ETUDE COMPARATIVE	
Titres,électrophorèse,immuno-électrophorèse,	
et immuno-diffusion.....	43
II - DEFICIT EN FONCTION DU SEXE ET DE L'AGE.....	49
III - DEFICIT EN FONCTION DU SYNDROME CLINIQUE.....	52
IV - RESUME DE NOS OBSERVATIONS.....	56
V - RESULTATS APRES THERAPEUTIQUE.....	76
- CONCLUSIONS.....	79
- BIBLIOGRAPHIE.....	87

A V A N T - P R O P O S

- - - - -

Le clinicien est amené souvent à voir des syndromes infectieux récidivants après antibiothérapie ou résistants à celle-ci, ce sont :

des infections respiratoires hautes et basses,
des infections cutanées,
des infections urinaires,
des diarrhées et splénomégalies,
des hémopathies malignes.

L'ensemble de ces manifestations entre dans le cadre des syndrômes de carence en anticorps (A.M.S. Antikörper Mangel Syndrom).

Il nous a semblé intéressant de nous pencher sur l'étude de ce problème.

Dans une première partie, nous évoquerons des généralités concernant les Immunoglobulines à activité anticorps et les déficiences en anticorps.

La deuxième partie traitera de la conduite du diagnostic biologique.

La troisième partie sera consacrée à notre travail qui comportera l'étude d'observations de malades vus dans le service d'Allergologie de Monsieur le Professeur MENARD.

- - - - -

I N T R O D U C T I O N

Il existe cinq types d'immunoglobulines ayant une activité anticorps, ce sont :

- les immunoglobulines G, (IgG),
- les immunoglobulines M, (IgM),
- les immunoglobulines A, (IgA),
- les immunoglobulines D, (IgD),
- les immunoglobulines E, (IgE).

Les IgG, IgA, IgD, IgE sont constituées par une association de deux chaînes protéiques lourdes (H) et de deux chaînes protéiques légères (L).

Par contre, les IgM sont constituées par un assemblage de chaînes lourdes et légères en nombre égal. Mais le nombre des chaînes est cinq fois supérieur à celui des autres immunoglobulines, l'IgM étant ainsi une macrogammaglobuline.

Les immunoglobulines diffèrent par leurs propriétés :

- Physico-chimiques, qui portent sur le poids moléculaire, la charge physico-chimique, la teneur en glucides liés.
- Antigéniques, les immunoglobulines étant des protéines, sont donc antigéniques et portent des déterminants antigéniques.

Les chaînes lourdes ont des déterminants antigéniques spécifiques de chaque immunoglobuline; par exemple, les chaînes lourdes des IgG sont dénommées gamma (γ).

Par contre, les chaînes légères sont identiques quelle que soit la classe d'immunoglobuline. Elle peut être de type Kappa (κ) ou Lambda (λ).

Il existe cinq types d'immunoglobulines ayant une activité anticorps, ce sont:

- les immunoglobulines G, (IgG),
- les immunoglobulines M, (IgM),
- les immunoglobulines A, (IgA),
- les immunoglobulines D, (IgD),
- les immunoglobulines E, (IgE).

Les IgG, IgA, IgD, IgE sont constituées par une association de deux chaînes protéiques lourdes (H) et de deux chaînes protéiques légères (L).

Par contre, les IgM sont constituées par un assemblage de chaînes lourdes et légères en nombre égal. Mais le nombre des chaînes est cinq fois supérieur à celui des autres immunoglobulines, l'IgM étant ainsi une macrogammaglobuline.


Les immunoglobulines diffèrent par leurs propriétés:

- Physico-chimiques, qui portent sur le poids moléculaire, la charge physico-chimique, la teneur en glucides liés.
- Antigéniques, les immunoglobulines étant des protéines, sont donc antigéniques et portent des déterminants antigéniques.

Les chaînes lourdes ont des déterminants antigéniques spécifiques de chaque immunoglobuline; par exemple, les chaînes lourdes des IgG sont dénommées gamma (γ).

Par contre, les chaînes légères sont identiques quelle que soit la classe d'immunoglobuline. Elle peut être de type Kappa (κ) ou Lambda (λ).

On peut donc établir ainsi la formule d'une immunoglobuline:



- Allotypiques.

Des différences antigéniques peuvent être retrouvées entre les individus d'une même espèce.

Ces différences reflètent des propriétés génétiques qui déterminent la présence d'un facteur antigénique donné. Ces facteurs antigéniques sont appelés allotypes.

Un individu qui ne possède pas un allotype donné peut s'immuniser contre cet allotype s'il reçoit des globulines d'un individu de même espèce qui le possède. Ceci pourrait expliquer la présence d'anti-allotypes dans les sérums de sujets sains: l'immunisation s'étant faite par des globulines maternelles au cours de la première enfance ou après des transfusions. Dans la polyarthrite rhumatoïde, l'individu semble s'immuniser contre certains de ses propres allotypes.

Jusqu'à présent, il a été possible d'identifier plus de vingt allotypes sur les chaînes lourdes de l'immunoglobuline G : GmI, Gm2...(C.Rppartz).

D'autre part, trois allotypes ont été identifiés sur les chaînes légères de type Kappa (K) des IgG, IgA, IgM. Ce sont: les facteurs Inv I, Inv2, Inv3, qui peuvent co-exister chez un même individu.

C'est ainsi qu'une même molécule d'IgG est marquée par un facteur Gm et un facteur InV.

Ces propriétés étant définies, nous rappellerons brièvement les différentes variétés d'Immunoglobulines.

- Les Immunoglobulines G (IgG).


Les immunoglobulines G ont été les plus étudiées. Le traitement par une papaine élimine 40 % du poids de l'anticorps sans altération du pouvoir de combinaison à l'antigène. Le fragment protéique éliminé représente le fragment Fc (Fragment cristallisable).

Fc ne possède pas de site anticorps mais joue un rôle dans la fixation cellulaire de l'IgG, dans le transfert placentaire, dans la fixation du complément et dans l'activité du facteur rhumatoïde.

Le reste de la molécule d'IgG peut réagir avec l'antigène, c'est le fragment F(ab)2, (fragment antibody). Si l'on réduit ce fragment F(ab)2, on obtient deux fragments F ab comportant chacun une chaîne légère et un reste de chaîne lourde Fd.

Le fragment F(ab)2 est divalent et précipite avec l'antigène. Le fragment F ab est monovalent et ne précipite pas avec l'antigène.

La figure de la page suivante (page 9) nous montre la structure des Immunoglobulines G.



Structure des Immunoglobulines G.

- Les Immunoglobulines A (IgA).

Les sites anticorps des IgA sont dispersés de la même manière que pour les IgG; mais en plus des IgA sériques, on trouve des IgA dans les sécrétions externes (colostrum, salive, sécrétions rhino-pharyngées), dont le taux est 5 à 10 fois plus élevé que celui des IgG dans le même liquide.

Les IgA des sécrétions possèdent les mêmes chaînes que les IgA sériques avec en plus un fragment supplémentaire dénommé T ou pièce de transport; ce fragment semble assurer à l'IgA son transfert du sérum vers le liquide de sécrétion ou inversement. Cette IgA serait plus résistante, grâce à ce fragment T, aux enzymes protéolytiques.

- Les Immunoglobulines M (IgM).

Chaque molécule d'IgM possède cinq sites anticorps toujours de même spécificité. L'IgM ressemble à une étoile à cinq branches au microscope électronique.

- Les Immunoglobulines D et E (IgD et IgE).

Les immunoglobulines D et E sont moins bien connues.

Les IgE représentent les anticorps réaginique responsables de l'hypersensibilité immédiate.

- - - - -

On ne peut concevoir l'étude de la fonction anticorps sans évoquer le problème de l'ontogénie, c'est à dire l'évolution normale des Immunoglobulines chez le fœtus et le nouveau-né.

La montée des Immunoglobulines G se fait progressivement par un don de la mère jusqu'à un maximum au moment du terme.


Puis il y a diminution spontanée par catabolisme des immunoglobulines transmises et la synthèse vient ensuite, suivant les besoins, remonter le taux naturel des immunoglobulines.

Le tableau de la page suivante (page I2) que nous emprunterons aux travaux de West et Coll. schématise l'évolution de ces taux dans les premières années de la vie.

Nous en retiendrons qu'à la naissance, les IgG sont essentiellement d'origine maternelle: entre 4 et 6 mois, leur taux est bas, plus bas qu'à la naissance: en effet, on note une diminution progressive des IgG maternelles, tandis que la montée des IgG synthétisées par l'enfant se fait de façon lente. A l'âge de 1 an, le taux des IgG est d'environ 50 % de celui de l'adulte normal.

Les IgM, d'origine non maternelle, sont en faible quantité à la naissance; le taux des IgM s'élève ensuite plus rapidement entre 4 et 6 mois, pour atteindre vers l'âge de 1 an un taux voisin de celui de l'adulte.

Quant aux IgA, on ne les trouve qu'à l'état de traces à la naissance; le taux reste faible entre 4 et 6 mois, et très variable d'un enfant à l'autre. Il restera encore bas vers l'âge de 1 an, pour n'atteindre 50 % de celui de l'adulte que vers l'âge de 4 à 5 ans.



Taux des diverses immunoglobulines chez le nouveau-né
et le nourrisson, d'après West et Col.

Le tableau suivant nous donnera les taux moyens des trois variétés d'immunoglobulines chez le nouveau-né et l'enfant, (d'après Stiehm et Fudenberg).

AGE	IgG mg/100 ml	IgM mg/100 ml	IgA mg/100 ml
Nouveau-né	1031 $\pm$ 200	11 $\pm$ 5	2 $\pm$ 3
1 à 3 Mois	430 $\pm$ 119	30 $\pm$ 11	11 $\pm$ 7
4 à 6 Mois	427 $\pm$ 186	43 $\pm$ 17	28 $\pm$ 18
7 à 12 Mois	661 $\pm$ 219	54 $\pm$ 23	37 $\pm$ 18
13 à 24 Mois	762 $\pm$ 209	58 $\pm$ 23	50 $\pm$ 24
25 à 36 Mois	892 $\pm$ 183	61 $\pm$ 19	71 $\pm$ 37
3 à 5 ans	929 $\pm$ 228	56 $\pm$ 18	93 $\pm$ 27
6 à 8 ans	923 $\pm$ 256	65 $\pm$ 25	124 $\pm$ 45

CHAPITRE II

LES DEFICITS EN ANTICORPS.

— — — — —

Les déficits immunitaires peuvent être
congénitaux ou acquis.

Le déficit immunitaire peut être global,
par diminution des anticorps humoraux et des cellules immuno-
compétentes.

Le déficit immunitaire peut être sélectif,
par diminution des anticorps: IgG, IgA ou IgM.

I - LES DEFICITS IMMUNITAIRES PRIMITIFS.

Suivant qu'ils atteignent les Immunoglobulines ou les réactions cellulaires, nous distinguerons:

- les déficits en immunoglobulines,
- les déficits portant sur l'immunité humorale et cellulaire.

Parmi les déficits en immunoglobulines, nous décrirons:

+ L'agammaglobulinémie liée au sexe: Maladie de Bruton.

C'est la première décrite, en 1952 par BRUTON.

Il s'agit d'une atteinte exclusive du système producteur d'immunoglobulines alors que l'immunité cellulaire est intacte. Elle se transmet selon le mode récessif lié au sexe et n'atteint donc que les garçons.

Les premiers symptômes débutent vers six mois jusqu'à deux ans; c'est une répétition de épisodes infectieux surtout bactériens. Malgré les infections rhinopharyngées, les ganglions cervicaux sont souvent de petite taille, les amygdales et végétations adénoïdes atrophiques.

Le diagnostic repose sur la mise en évidence d'un déficit global des immunoglobulines; l'immunité cellulaire est normale; histologiquement, les follicules lymphoïdes sont peu développés. Enfin, un fait fondamental: aucun plasmocyte n'est présent dans la moëlle osseuse, la rate, les intestins. Le thymus, lui, est normal.

+ Les agammaglobulinémies non liées au sexe.

Elles sont congénitales. Parfois, l'étude des antécédents familiaux permet d'évoquer une transmission récessive autosomique; ailleurs l'enquête est négative.

Elles se distinguent de la maladie de Bruton par: un début généralement plus tardif, des infections essentiellement respiratoires, la fréquence d'un syndrome coeliaque, l'existence fréquente de végétations adénoïdes, d'adénopathies, d'hépatomégalie, et effondrement moins important des immunoglobulines.

Anatomiquement, la structure folliculaire ganglionnaire est peu apparente. On peut observer des adénopathies avec une hyperplasie réticulaire importante ou avec un aspect simulant celui d'un lymphome giganto-folliculaire.

Le thymus lui est le plus souvent normal.

Cependant, dans 10 % des cas, on a trouvé l'existence d'un thymome de type fusocellulaire qui peut précéder l'agammaglobulinémie.

+ Les déficits dissociés en immunoglobulines.

Décelés par immuno-électrophorèse, les déficits dissociés en immunoglobulines s'observent dans les deux sexes.

Dans le type I, il s'agit d'une absence isolée d'IgA. On le rencontre chez les sujets apparemment normaux ou au cours des syndromes variés tels que: ataxie téléangiectasie, syndromes coeliaque avec malabsorption.

Le type II représente le déficit en IgM et IgA; les IgG sont normales. Ce type paraît exceptionnel.

Le type le plus fréquent est le type III.

Il se caractérise par un déficit en IgG et IgA avec une augmentation nette des IgM. Il touche l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Des manifestations auto-immunes sont souvent notées: anémie hémolytique, thrombopénie; il est à noter que l'élévation des IgM peut être importante, mais parfois son taux se normalise soit spontanément, soit après injection de gammaglobulines.

Plus rares sont les déficits en IgG et IgM, avec IgA normale ou élevée. Quant aux déficits isolés en IgG ou IgM, ils sont également rarement observés.

+ L'hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson.

Elle traduit un retard de maturation du système immunitaire. La phase d'hypogammaglobulinémie, physiologique entre 2 et 5 mois, peut se prolonger jusqu'au 9^{ème} mois.

La distinction entre carence congénitale et déficit transitoire est souvent très difficile avant 1 an; l'absence de révélation de la fraction IgM au delà du 6^{ème} mois représente un élément d'orientation valable en faveur d'une agammaglobulinémie congénitale.

Le tableau suivant nous résumera les principaux caractères de ces déficits en immunoglobulines.

	LIE AU SEXE	TRANSMISSION	CLINIQUE	DIAGNOSTIC	IMMUNITÉ CELLULAIRE
ALADIE DE BRUTON	+	Mode récessif	Episodes infectieux à répétition.	Déficit glo- bal des Ig	Intacte
GAMMAGLO- ULINEMIE ONGENITALE	0	Récessive Autosomique	Début tardif Inf.Respira- toires Syndr.Coeliaque	Déficit moins marqué que dans la mal. de Bruton.	Intacte
YPE I	0	Récessive Autosomique	Ataxie télan- giectasie Syndr.Coeliaque	Absence iso- lée d'IgA	
YPE II	0			Deficit en IgA et IgM IgG normales	
YPE III	0		Anémie Hémoly- tique Thrombopénie	Déficit en IgG et IgA Augmentation des IgM	
POGAMMA- OBULINEMIE ANSITOIRE NOURRIS- N.	0		Infections graves et répé- tées.	Absence de révélation de la fraction IgM	Intacte

DEFICITS IMMUNITAIRES HUMORAUX.

Parmi les déficits portant sur l'immunité Humoral et cellulaire, nous décrivons:

+ L'athymolymphoplasie.

Elle fut décrite en 1950 en Suisse par Glanzmann et Riniker qui parlèrent alors de "lymphocytophtisie essentielle" ou agammaglobulinémie de type Swiss.

C'est une carence immunitaire globale, cellulaire et humorale, de transmission héréditaire récessive autosomique donc touchant les deux sexes.

Le début est précoce, dans le 2^{ème} ou 3^{ème} mois de la vie, se manifestant par l'existence d'infections à répétition.

Les vaccinations par vaccins vivants (Vaccine, B.C.G.) conduisent à la dissémination et à la mort.

Au stade tardif de la maladie, survient fréquemment un exanthème morbiliforme; l'évolution est presque toujours fatale dans la première année de la vie.

Le diagnostique repose sur trois anomalies biologiques:

- l'agammaglobulinémie touchant les 3 classes.
- la lymphopénie.
- l'absence de réaction d'hypersensibilité retardée, (taux nul ou très bas de la transformation lymphoblastique en présence de phytohémagglutinine, nous y reviendrons au cours de notre étude).

L'examen anatomique conclut à une atrophie d'en-

semble du tissu lymphoïde, l'absence de plasmocytes dans la moëlle et l'aplasie du thymus. Il semble que le trouble primitif soit un défaut de maturation de la cellule souche primitive qui ne se différencierait pas vers les lignées cellulaires immunocompétentes commandant l'immunité cellulaire et humorale.

+ La lymphoplasie thymique.

Le tableau est le même que celui de l'athymolymphoplasie, mais la transmission, liée au sexe, ne touche que les garçons.

+ Les autres déficits immunitaires.

a- le syndrome de Robert Good.

Il se traduit par ~~une~~ agammaglobulinémie avec thymome. Il n'a pas été démontré de caractère génétique.

b- le syndrome de Wiskott-Aldrich.

Il s'agit d'une affection génétique à transmission récessive liée au sexe, seuls les garçons sont atteints; les filles sont conductrices.

Les premières manifestations sont toujours précoces, se révélant au cours des six premiers mois.

Cliniquement, cette affection se traduit par trois ordres de signes:

- des signes hémorragiques, (purpura),
- des signes cutanés, (dermite eczéma),
- des signes infectieux.

L'évolution est mortelle, généralement dans un délai de deux ans.

Quant à la nature du déficit immunitaire, elle est complexe.

Le développement du thymus et du tissu lymphoïde est normale au début de la vie; secondairement, se produit une atteinte progressive de l'immunité cellulaire avec diminution du taux de lymphocytes circulants.

Le développement des centres germinatifs ganglionnaires et des cellules plasmocytaires est normal de même que la synthèse des immunoglobulines.

Bien que le taux des IgM soit souvent diminué de façon significative, des anticorps de cette classe peuvent être mis en évidence après certaines stimulations antigéniques.

Les mécanismes de défense aspécifiques (polynucléaires, macrophages, complément), sont normaux.

Le déficit immunitaire fondamental récemment mis en évidence semble l'incapacité de reconnaître les antigènes polysaccharidiques. Ce déficit primitif pourrait expliquer les concentrations basses d'IgM.

c- la dysgénésie réticulaire.

Elle est rare et héréditaire. Sur le plan biologique, elle se traduit par une alymphocytose et une agranulocytose alors que le taux sanguin des hématies et des plaquettes est normal. L'histologie conclut à une hypoplasie thymique.

On évoque à l'origine, une atteinte de la cellule souche réticulaire.

d- le syndrome de Gibbling.

Il s'agit là d'une lymphopénie primitive.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

•

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

•

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

d- le syndrome de Gibbling.

Il s'agit d'une lymphopénie primitive.

e- l'ataxie-télangiectasie.

Cette maladie est héréditaire et à transmission autosomique récessive.

C'est une maladie de l'enfant qui a été décrite en 1941 par Louis Ban, et qui associe des troubles cérébelleux et des télangiectasies siégeant sur la conjonctive bulbaire et certains territoires cutanés.

Il existe d'une part, un syndrome de carence immunitaire responsable d'infections à répétitions marqué par un profond déficit en IgA, et d'autre part une diminution des réactions d'hypersensibilité retardée (lymphopénie, défaut de rejet des homogreffes, transformation lymphocytaire diminuée).

L'examen anatomique montre souvent une hypoplasie lymphoïde et des anomalies du thymus, (hypoplasie thymique avec absence de cortex et de corpuscules de Hassal).

L'évolution de la maladie est sévère. Les sujets meurent souvent avant l'adolescence, d'infections pulmonaires.

Un certain nombre développe des hémopathies malignes.

Le tableau de la page suivante (page 24), nous résume ces différents déficits immunitaires humoraux et cellulaires.

	LIE AU SEXE	TRANSMISSION	CLINIQUE	DIAGNOSTIC	ATTEINTE CELLULAIRE & HUMORALE
MO- PHOPLA-	O	Récessive Autosomique	Début précoce Infections à répétition Evolution mor- telle.	Agammaglobu- linémie Lymphopénie	+
PHOPLAS THYMI-	+		" " " "	" " " "	+
ROME DE RT GOOD	O		Thymome	Agammaglobu- linémie	+
ROME DE OTT- RICH	+		Début précoce Purpura Dermite eczéma- tiforme. Infections à répétition Evolution mor- telle.	Diminution du taux des lymphocytes circulants. Diminution des IgM	+
ENESIE CULAIRE	O			Alymphocytose Agranulocytose	+
ROME DE LING				Lymphopénie primitive	
IE NGIEC- E.	O	Recessive Autosomique	Troubles céré- belleux Télangiectasies sur la conjonc- tive bulbaire et les terri- toires cutanés Infections à répétition.	Absence isolée d'IgA	+

DEFICITS IMMUNITAIRES HUMORAUX ET CELLULAIRES.

✦

A-21-16

111612-12

II - LES DEFICITS IMMUNITAIRES SECONDAIRES.

= = = = =

La plupart sont en rapport avec un catabolisme exagéré et une déperdition périphérique ou une diminution de synthèse.

Nous étudierons succesivement des déficits immunitaires secondaires portant sur la synthèse des gammaglobulines; ensuite nous verrons les déficits immunitaires secondaires à une augmentation du catabolisme, puis nous terminerons par les hypogammaglobulinémies secondaires à une déperdition exscessive.

I) - Les déficits portant sur la synthèse des gammaglobulines.

- la maladie de Hodgkin.

Le déficit est associé ou non à une gammapathie monoclonale. On note une atteinte de l'hypersensibilité retardée importante, ainsi qu'une négativité de la cuti-réaction à la tuberculine, de même que dans la maladie de Besnier-Boeck-Schaumann.

- les gammapathies monoclonales.

Ceñles-ci sont constituées par le myélome et la maladie de Waldenström.

- les néoplasies.

Lymphoprolifératives, avec ou sans gammapathies monoclonales.

2) - Les déficits secondaires à une augmentation du catabolisme

- l'hypoprotidémie hypercatabolique familiale idiopathique.
- la dystrophie myotonique.

Il s'agit là d'une diminution des IgG et de leur demi-vie, par altération primitive des IgG ou modification du catabolisme.

L'étude se fait avec des IgG marquées.

Si on injecte à un sujet normal des IgG d'un sujet malade, on note un catabolisme normal. Par contre, les IgG d'un ~~sujet nor-~~mal injectées à un sujet malade, entraînent une augmentation du catabolisme.

- le syndrome de Sjögren.

On peut y voir une gammapathie monoclonale à IgM associée à une diminution des IgG, une cryoprécipitation des complexes IgG- IgM, alors que les IgG ou IgM isolées ne précipitent pas.

3) - Les hypogammaglobulinémies secondaires à une déperdition.

- Le syndrome néphrotique.

Le rein semble avoir une fonction catabolique normale à l'égard des chaînes légères, mais la fuite est accélérée par l'altération du filtre glomérulaire: d'où une tendance à l'augmentation des chaînes non dégradées.

- Le syndrome de type sprue.

Il s'agit d'un syndrome clinique de fistule lymphocytaire créé par des lymphangiectasies intestinales.

PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

= =

DU SYNDROME DE CARENCE EN ANTICORPS.

= =

Le dépistage des troubles de la fonction anticorps sera basé sur la pratique de divers examens biologiques explorant d'une part les déficits humoraux, d'autre part les déficits cellulaires.

Divers éléments compléteront cette exploration.

I - METHODES EXPLORANT LES DEFICITS HUMORAUX.

Les déficits humoraux seront explorés de la façon suivante.

- L'étude des titres.

Le titre des antistreptolysines sera inférieur à 20 Unités TODD dans les A.M.S. (Antiköper Mangel Syndrom). Il est nécessaire d'adapter une technique spéciale à la recherche de ces taux abaissés.

Le titre des Antistaphylolysines est également très abaissé, inférieur à 2 U.I./ml.

Le titre des isohémagglutinines naturelles du groupe sanguin (système A B O) est également nul ou fortement abaissé (inférieur à 1/32 ème) sauf pour AB (le titre pouvant être normalement nul).

- L'étude du taux des antitoxines.

Cette étude du taux se fera avant une vaccination, au 8 ème et au 15 ème jour.

- L'électrophorèse.

Cet examen sera demandé en sachant qu'il s'agit là d'une recherche biologique insuffisante et infidèle. Le pic des gammaglobulines constitue en effet la résultante de plusieurs immunoglobulines, à activité anticorps ou non, dont la diminution d'une des fractions peut être compensées par l'augmentation d'une autre.

- L'immunoélectrophorèse.

C'est une technique intéressante qui précise les anomalies qualitatives des gammaglobulines. Elle est donc insuffisante dans le diagnostic des hypogammaglobulinémies, nombreux sont les faits cliniques ayant montré cette discordance.

La méthode associe un temps électrophorétique et un temps immunologique:

- Un temps électrophorétique où les protéines sont séparées en fonction de leur charge électrique et de leur poids moléculaire; le support (milieu gélifié) joue un rôle de filtre.
- Un temps immunologique qui consiste en une précipitation des différentes protéines, ainsi séparées, par des immuns sérums totaux ou monospécifiques. Il est possible de différencier chaque protéine selon ses caractères immunologiques. Cette diffusion se fait de façon perpendiculaire à la migration électrophorétique.

Par cette méthode associant deux modes de séparation, il est possible de faire une étude très spécifique d'un grand nombre de protéines autrefois impossibles à distinguer (une trentaine: Albumine, Orosomucoïde, haptoglobine, céruloplasmine, sidérophiline, immunoglobulines, ...).

Toutefois, cette méthode reste qualitative, aussi lui préférons-nous, pour la détection des hypogammaglobulinémies: l'Immuno-diffusion de Mancini.

- L'immuno-diffusion de Mancini.

C'est une méthode qui donne la détermination quantitative d'une immunoglobuline.

Le principe en est le suivant: dans la rigole centrale, on met un antisérum monospécifique (donc les anticorps sont répartis et diffusent dans l'agar); dans le "trou", on met le sérum à doser.

La diffusion se fera de façon centrifuge; au départ, l'anticorps est en excès, mais au fur et à mesure qu'il s'éloigne, sa concentration baisse. Lorsque le point d'équivalence avec l'immun sérum est atteint, il se produit une précipitation circulaire. Le cercle est d'autant plus grand que la concentration au départ est plus forte. Par comparaison avec une courbe d'étalonnage, on exprime l'immunoglobuline en mgr/100 ml.

L'immunoglobuline G représente 75 % des immunoglobulines du sérum. Le taux normal est de 1200 ± 300 mgr/l.
L'immunoglobuline A a un taux sérique de 288 ± 121 mgr/100 ml.

L'immunoglobuline M a un taux de 80 ± 29 mgr/100 ml.
Quant à l'immunoglobuline D, son taux sérique est faible puisqu'il se situe aux environs de 3 mgr/100 ml.

Enfin, l'immunoglobuline E a un taux sérique extrêmement faible, puisqu'il est compris entre 0,001 mg/100 et 0,014 mgr/100 ml, soit environ 1/50.000 du taux de l'immunoglobuline G et 1/5000 du taux de l'immunoglobuline A.

Nous résumerons dans le tableau de la page suivante, (page 33) ces différents taux sériques;

	Taux sérique en mgr/100 ml.
IgG	1200 $\pm$ 300
IgA	288 $\pm$ 121
IgM	80 $\pm$ 29
IgD	3
IgE	0,001 à 0,014

Taux sériques des Immunoglobulines.(mgr/100 ml)

II - METHODES EXPLORANT LES DEFICITS CELLULAIRES.

Les déficits cellulaires seront explorés par les méthodes suivantes.

- La numération formule sanguine.

On s'intéressera surtout à la recherche d'une lymphopénie.

On pratiquera la numération des petits lymphocytes.

- La radiographie de la région thymique.

Celle-ci sera pratiquée à la recherche d'une ombre du thymus marquée chez les jeunes enfants.

- L'étude de la réponse cellulaire in vitro.

Cette étude se pratique par le test de transformation lymphoblastique. Il s'agit d'une culture de petits lymphocytes du sujet en présence de tuberculine et de phytohémagglutinine à différentes concentrations.

Il en résulte une transformation lymphoblastique par augmentation de la synthèse des acides nucléiques.

P.H.A.	% de Cellules Blastiques
0,4 mgr	50 à 80 %
0,2 mgr	40 à 60 %
0,1 mgr	30 à 50 %
0,05 mgr	10 à 20 %

III - 8 DIVERS ELEMENTS COMPLETENT CES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES

Le diagnostic du syndrome de carence en anticorps peut être complété par d'autres éléments.

- La biopsie rectale et ganglionnaire.

Celle-ci consistera en la recherche de tissu lymphoïde dans les ganglions régionaux, surtout après stimulation antigénique avec un antigène inoffensif.

- L'étude familiale.

Celle-ci sera conduite à la recherche des antécédents paternels, maternels et collatéraux.

Cette enquête sera complétée par la recherche d'autres déficits immunitaires, les circonstances d'une grossesse (notamment la survenue d'une infection pendant la gestation, la rubéole en particulier; il semble en effet qu'une affection du système immunitaire puisse être déclenchée par une infection rubéolique intra-utérine ou néo-natale).

- Caryotype, recherche d'une mosaïque feront également partie des éléments du diagnostic.

IV - CONDUITE PRATIQUE DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE.

Dans notre pratique, le diagnostic de syndrome de carence en anticorps se conduit en deux étapes.

La première étape utilise les examens biologiques de pratique courante, c'est à dire:

- l'étude des trois titres:
 - titre des Antistreptolysines,
 - titre des Antistaphylolysines,
 - titre des isohémagglutinines.
- l'électrophorèse.

Ces deux examens explorant les déficits humoraux, alors que les examens suivants explorent les déficits cellulaires:

- la numération des petits lymphocytes.
- l'intra-dermo-réaction à la tuberculine à 3 Unités.

Deux possibilités se présentent alors:

- Les titres sont abaissés ainsi que les gammaglobulines à l'électrophorèse. Le diagnostic est confirmé.

- Les titres sont normaux, l'électrophorèse est normale. Nous devons poursuivre par des investigations plus spécialisées pour étayer le diagnostic clinique.

Ainsi, au cours de la seconde étape, il sera fait appel à l'immuno-diffusion de Mancini, en ce qui concerne le déficit humoral.

Pour ce qui est de l'immunité cellulaire, le test de transformation lymphoblastique viendra compléter notre bilan diagnostique.

Nous noterons, pour terminer, que ces examens, coûteux et de pratique délicate, ne peuvent se faire que dans des laboratoires très spécialisés.

NOTRE ETUDE PERSONNELLE

Nous nous sommes essentiellement penchés sur l'étude du déficit immunitaire humoral.

En effet, la majorité de nos malades avait des réactions tuberculiniques (intra-dermo-réaction à 3 Unités systématiques chez tous nos sujets) normales et un taux de lymphocytes circulants également normal.

Notre travail comportera plusieurs rubriques.

Nous envisagerons d'abord l'étude comparative des titres, l'électrophorèse et l'immunoélectrophorèse ou l'immuno-diffusion.

Ensuite, le déficit immunitaire sera évoqué en fonction du sexe et de l'âge et en fonction du syndrome clinique.

La dernière rubrique sera consacrée aux résultats après thérapeutique spécifique par gammaglobulines.

E T U D E C O M P A R A T I V E

des TITRES,
de l'ELECTROPHORESE,
de l'IMMUNO-ELECTROPHORESE,
de l'IMMUNO-DIFFUSION.

Jusqu'à ces dernières années, l'électrophorèse représentait le seul élément biologique qui nous permettait d'apprécier la fonction anticorps d'un sujet.

Chez nos malades, les gammaglobulines étaient diminuées d'un tiers dans 25 cas et de la moitié dans 4 cas.

	ELECTROPHORESE	
	8 g/l	6 g/l
25 sujets	25	4

La première étape du diagnostic de syndrome de carence en anticorps comporte l'étude des titres et de l'électrophorèse.

Sur 16 observations, la comparaison entre:

- les trois titres:

- antistreptolysines,
- antistaphylolysines,
- isohémagglutinines anti-A et anti-B.

- et l'électrophorèse:

a été concordante dans 7 cas, ces 4 éléments ont donc été suffisants pour confirmer le diagnostic de déficit immunitaire humoral: effondrement des titres, diminution d'un tiers des gamma-

globulines à l'électrophorèse.

7 de nos observations illustrent ces faits.

Nous rapporterons celle de Monsieur CHE...Jean Marie.

Monsieur CHE...Jean Marie (observation N° 1)
âgé de 64 ans présente un asthme à dyspnée
continue, continue-dépendant (dose minima effi-
cace 4 mgr) à déclenchement infectieux.

La mesure de la fonction anticorps a révélé:

- antistreptolysines: 12 U.TODD

- isohémagglutinine:

Anti-A: 1/16

Anti-B: 1/16

- gammaglobulines: 11,5 %

Une injection intramusculaire de 10 ml de gammaglobu-
line a été faite au malade.
malade.

Les poussées infectieuses sont devenues rares et
et la dose minima efficace des corticoïdes a
été réduite à 1 mgr quotidien.

On a noté une discordance des trois titres et de
l'électrophorèse dans 9 cas.

Soit que les titres étaient normaux et les gamma-
globulines diminuées à l'électrophorèse (6 cas).

Tel était le cas de Monsieur RU...Jacques,
(observ. N°2) qui présentait des bronchites
hivernales à répétition.

Les trois titres étaient normaux;

- antistreptolysines: 125 U.TODD,

- antistaphylolysines: 5 U.I./ml,

- isohémagglutinine: anti-A : 1/32

anti-B : 1/32

Mais les gammaglobulines étaient diminuées à l'électrophorèse: 9,5 % soit 5,5 g/l.

Soit que les titres étaient diminués et l'électrophorèse normale (3 cas).

Ainsi, Madame CAR...Georgette, (observ. N°50) âgée de 63 ans, qui présentait une parakératose infectieuse.

Le bilan de la fonction anticorps a montré:

- une diminution des titres:

- antistreptolysines: 12 U. TODD,
- antistaphylolysines: 1,33 U.I./ml,
- isohémagglutinine:

anti-A : 1/16

anti-B : 1/8

- mais les gammaglobulines à l'électrophorèse étaient normales: 17 % soit 10,5 g/l.

Le tableau suivant résume cette étude comparative des titres et de l'électrophorèse.

Sujets	Titres	Electrophorèse
7	abaissés	abaissée
6	normaux	abaissée
3	abaissés	normale

Chez 5 de nos sujets, on a pu comparer les résultats de l'électrophorèse avec l'immunodiffusion de Mancini ou l'immuno-électrophorèse.

Dans 2 cas, il a été impossible d'apprécier le déficit immunitaire, constaté à l'électrophorèse, par l'immuno-électrophorèse.

Dans un seul cas, électrophorèse et immuno-électrophorèse étaient concordantes. Il faut noter toutefois que, ainsi que nous l'avons déjà exprimé, l'immuno-électrophorèse ne donne que des résultats qualitatifs; c'est pourquoi nous lui préférons l'immuno-diffusion de Mancini.

Malgré une électrophorèse normale, chez 2 de nos malades, l'immuno-diffusion a été suffisante pour détecter le syndrome de carence en anticorps.

Tel est le cas de Monsieur BRU... (Observ. N° 7) âgé de 20 ans, qui présente une urticaire, un oedème de Quincke à déclenchement infectieux. Les gammaglobulines sont augmentées à l'électrophorèse: 25,5 % soit 17 g/l.

L'immuno-diffusion de Mancini a révélé la diminution des IgG à 520 mgr/100 ml.

Notre tableau résume cette étude comparative de l'électrophorèse et de l'immuno-diffusion ou de l'immuno-électrophorèse.

Sujets	Electrophorèse	Immunoélectrophorèse	Immunodiffusion
2	abaissée	normale	
1	abaissée	abaissée	
2	normale		abaissée

Les deux étapes du diagnostic biologique ont été pratiquées chez 5 sujets.

La jeune GEN...Bénédicte, (Observ.N°53) âgée de 11 ans, présente une bronchite asthmatiforme " qui n'est bien que sous anti-infectieux et anti-histaminiques" (Docteur Bonhomme), et qui récidive dès l'arrêt de ses médications. L'électrophorèse et les titres (sauf l'isohémagglutinine anti-B = 1/4) sont normaux.

Seule l'immuno-diffusion de Mancini a permis de confirmer le diagnostic par la nette diminution des IgG à 320 mgr/100 ml et celle des IgA à 90 mgr/100 ml.

Les 4 autres sujets avaient des titres normaux.

Le syndrome de carence en anticorps, suspecté par la diminution des gammaglobulines à l'électrophorèse, a été confirmé par l'immuno-électrophorèse dans un cas, ou l'immuno-diffusion de Mancini dans les trois autres cas.

Le tableau suivant nous résume l'étude de ces 5 sujets.

Sujets	Titres	Electrophorèse	Immunoélectrophorèse	Immunodiffusion
	Normaux	Normale		Abaissée
	Normaux	Abaissée	Abaissée	
	Normaux	Abaissée		Abaissée

DEFICITS IMMUNITAIRES EN FONCTION

DU SEXE ET DE L'AGE

Si nous considérons:

- le sexe du sujet.

Le syndrome de Carence en anticorps semble plus fréquent chez les hommes puisque, sur 55 observations, nous avons étudié 31 hommes, soit 56,2 %, le nombre des femmes ayant été de 24, soit 43,8 % de nos observations.

- l'âge du sujet.

Nous remarquons que le syndrome d'hypogammaglobulinémie est fréquent chez les adolescents et les adultes (entre 14 et 25 ans: 17 cas), et chez les sujets après la quarantaine (15 cas).

Le diagnostic biologique a été fondé sur:

- l'électrophrèse seule dans 29 cas,
- l'électrophorèse et les titres dans 16 cas,
- l'électrophorèse et l'immuno-diffusion ou l'immunoélectrophorèse dans 5 cas.
- les titres, l'électrophorèse et l'immunodiffusion ou l'immunoélectrophorèse dans 5 cas.

Le tableau suivant confronte ces différentes études.

E	NOMBRE TOTAL DE SUJETS	D I A G N O S T I C B I O L O G I Q U E			
		Electropho- rèse seule	Titres et Electropho- rèse	Electropho- rèse et Immuno E ou Immuno D	Titres Electropho- Immuno E ou Immuno D
4 ans	4 soit 7,3%	I	I	I	I
13 ans	II soit 20 %	8	2	0	I
25 ans	I7 soit 31 %	7	6	2	2
40 ans	8 soit 14,5%	8	0	0	0
de ans	I5 soit 27,3%	5	7	2	I
l éral	55 sujets	29	I6	5	5

DEFICITS IMMUNITAIRES EN FONCTION
DU SYNDROME CLINIQUE.

- - - - -

Selon le syndrome clinique, 28 sujets
présentaient des syndrômes respiratoires.

Le déficit immunitaire était surtout
réquent dans l'asthme (18 sujets, soit 64 %).

Syndrôme clinique	Nombre d'observations
Asthme	18
Rhino-trachéo bronchites récurrentes	4
Rhinite pollinique	3
Angines récurrentes	1
Rhinite et paraké- ratoses infectieuses	1
Dilatation des bronches	1

Dans les syndrômes cutanés, le syndrôme de
 rence enanticorps a été fréquent surtout dans les eczémas
 infectieux (5 cas sur 22) et les acnés pustuleuses.

Syndrôme clinique	Nombre d'observations
Dermo-épidermite infectieuse	4
Eczéma par hypersensibilité bactérienne ou mycosique	5
Hyperhydrose Dermite de contact	I
Urticaire Oedème de Quincke	3
Acné pustuleuse	4
Furoncles récidivants	3
Psoriasis	I
Parakératose psoriasiforme	I

Plus rarement, nous avons diagnostiqué une carence en immunoglobuline dans trois syndrômes rhumatismaux:

- I pol - 2 Polyarthrites chroniques Rhumatoïdes,
- I Rhumatisme Articulaire Aigu.

Enfin, notre étude a comporté un cas de pyélonéphrite récidivante et une ostéite staphylococcique.

Dans ce dernier cas, il s'agissait de Monsieur Que...Jean Michel, (observ. N°6), âgé de 23 ans présentant des poussées d'ostéite à staphylocoque récidivantes, traitées par antibiothérapie et curetage chirurgical.

Mais la mesure de la fonction anticorps révélait un déficit immunitaire sur les seuls titres:

- antistaphylolysines : 2 U.I./ml,
- isohémagglutinine anti-B : 1/8.

et l'électrophorèse:

- gammaglobulines: 13 % soit 8,50 gr/l.

Malgré 4 injections de gammaglobulines, à raison de 1,65 gramme toutes les 3 semaines, l'immuno-diffusion de Mancini confirmait l'hypogammaglobulinémie des trois fractions:

- IgG : 840 mgr/100 ml,
- IgA : 186 mgr/100 ml,
- IgM : 31,5 mg/100 ml.

La poursuite des gammaglobulines, associée à une vaccination antistaphylococcique, est suivie d'une rémission qui se maintient depuis 3 ans.

RESUME DE NOS OBSERVATIONS.

- - - - -

DESCRIPTION	N° 1	N° 2	N° 3
	CHE...J. Marie	RUA...Jacques	RAN...A.
	64 ans	23 ans	20 ans
	M	M	F
HISTORIQUE	Asthme à dyspnée continue	Bronchites hivernales à répétition	Dermite eczémateuse
PRETEST	12 U.TODD	125 U.TODD	50 U.TODD
CAPYLO		5 U.I./ml	0,1 U.I./ml
AGGLUTINATION	anti-A I/I6 anti-B I/I6	anti-A I/32 anti-B I/32	anti-A I/8 anti-B I/32
PROPHYLAXIE	11,5 %	9,5 % - - 5,5 g/l	12,5 % - 8 g/l
DOSE			
TRAIITEMENT	- Vaccinothérapie - Gammaglobulines	- Antiinfectieux - Gammaglobulines	- Vaccinothérapie - Gammaglobulines
STATUT	- Très amélioré - Corticothérapie diminuée - Moins d'état infectieux	Excellent	Non Revu

ATION	N° 7	N° 8	N° 9
	BRU... X	RIC... Josette	RIV... Marc
	20 ans	34 ans	8 ans
	M	F	M
STIC UE	Urticaire Oedème de Quincke	Asthme	OEDEME de QUINCKE Rhino-pharyngite à répétition.
REPTO			
APHYLO			
AGGLU-			
OPHO-	25,5 % - - 17 g/l	13 % - - 7,5 g/l	14 % - - 7 g/L
0-ELEC- ORESE ou SION	IgG: 320 mg/100 ml IgA: 220 mg/100 ml IgM: 54 mg/100 ml		
EMENT	Gammaglobulines	Gammaglobulines	Gammaglobulines
ATS	Amélioration	Amélioration	Très bien après 2 mois.

ATION	N° IO	N° II	N° I2
	LAI...Martine	MAR...Serge	GAU...X
	24 ans	8 ans	34 ans
	F	M	M
STIC	Dermo épidermite infectieuse	Rhinite pollinique	Bronchites à répétition Asthme
UE			
REPTO			
APHYLO			
AGGLU-			
POPHO	14 % - - 7 g/l	10 % - - 6,5 g/l	12 % - - 8,5 g/l
ELEC-			
ORESE ou			
SION			
EMENT	Gammaglobulines	- Désensibilisation - Amphovaccin intestinal - Gammaglobulines	- Antibiotique - Gammaglobulines - Bronchodilatateur.
ATS	Amélioration	Non revu	Amélioration

ERVATION	N° I3	N° I4	N° I5
S	FAN...X	PAS...J.Charles	VER...X
	46 ans	5 ans	39 ans
E	F	M	M
DIAGNOSTIC	- Bronchites	- Angines fréquentes	- Pyé lo -néphrite
CLINIQUE	- Astme	- Bronchite asthma- tiforme.	- récidivante
ISTREPTO			
ISTAPHYLO			
HEMAGGLU-			
LINE			
CTROPHO			
E	II,5 % - - 6,5 g/l	9 % -- 6,8 g/l	II,5 % - - 7 g/l
MUNO-ELEC-			
PHORESE ou	Normale		
FUSION			
TEMENT	- Antiinfectieux - Gammaglobuline - Désensibilisa- tion	- Vaccinothérapie - Gammaglobulines - Désinfection O.R.L.	- Antiinfectieux - Gammaglobulines - Vaccinothérapie
ULTATS	Non revu	Amélioration	Amélioration

ERVATION	N° I6	N° I7	N° I8
S	SAN...Madeleine	SOU...X	NAU...Nicole
	40 ans	46 ans	19 ans
E	F	F	F
GNOSTIC	- Bronchite - Asthme	Dermo-épidermi- te eczématifor- me	- Dermite infec- tieuse - Asthme.
NIQUE			
ESTREPTO			
STAPHYLO			
HEMAGGLU- -LINE			
TROPHO- -	II % - - 8,5 g/l	II % - - 6,5 g/l	12,5 %
INO-ELEC- PHORESE ou FUSION			
TEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion	- Gammaglobulines - Antibiotiques - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie
ULTATS	Amélioration	Guérison complète	Guérison

ERVATION	N° 19	N° 20	N° 21
S	MAU...Odette	CAS?...Patrice	GOU...Liliane
	56 ans	8 ans	10 ans ½
E	F	M	F
ENOSTIC NIQUE	Acné pustuleuse	- Eczéma et asthme	Urticaire
ISTRIFPTO			500 U.TODD
HEMAGGLU- LINE			
TROPHO- E	13 % - - 8,5 g/l	12,5 % - - 8 g/l	11,5 %
TEMENT	Gammaglobulines	- Gammaglobulines - Anti-infectieux - Désensibilisa- tion.	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion.
ULTATS	Non Revu	Non Revu	Très bien depuis 3 ans.

RVATION	N° 22	N° 23	N° 24
	JOU...Catherine	JOL...René	BOH...Martine
	20 ans	20 ans	15 ans
	F	M	F
DIAGNOSTIC CLINIQUE	Asthme	- Eczéma - Asthme	Angines à répétition
ESTREPTO			300 U.TODD
STAPHYLO			
HEMAGGLU- -TINE			
PROPHO-	I4 % - - 8,5 g/l	II,5 % - - 7,5 g/l	I3 % - - 7,5g/l
NO-ELEC- PHORESE ou FUSION			
TEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion	-Gammaglobulines -Anti-infectieux
ETATS	Non revu	Amélioration de l'asthme	Mieux Angines moins fréquentes

OBSERVATION	N° 25	N° 26	N° 27
S	BLU...Bernard	PER...Noëlle	PEL...Huguette
	25 ANS	7 ans	22 ans
E	M	F	F
DIAGNOSTIC CLINIQUE	Acné	- Eczéma consti- tutionnel - Bronchites - Asthme	- Polyarthrite rhumatoïde - Bronchectasie
ANTISTREPTO		333 U.TODD	100 U.TODD
ANTISTAPHYLO		25 U.I./ml	0,7 U.I/ml
HEMAGGLU- LINE		anti-B 1/8	anti-A 1/16
ELECTROPHO- RE	12,5 % - - 8 g/l	13 % - - 9,5 g/l	16 % - - 10 g/l
MUNO-ELEC- TROPHORESE ou DIFFUSION			
Traitement	- Gammaglobulines - anti-infectieux	- Gammaglobulines - anti-infectieux - Désensibilisa- tion	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie
RÉSULTATS	Amélioration	Persistance des crises d'asthme	Non revu


ERVATION	N° 28	N° 29	N° 30
S	PEU...J.Pierre	GRU...Suzanna	BRI...Louis
	16 ans	45 ans	58 ans
E	M	F	M
ENOSTIC NIQUE	Rhinite printanière	Eczéma	Eczéma
ISTREPTO			
ISTAPHYLO			
HEMAGGLU- LINE			
CTROPHO- E	14 % - - 9 g/l	10 % - - 6,5 g/l	16,5 % - - 8,5 g/l
UNO-ELEC- PHORESE ou FUSION			
ITEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion	- Gammaglobulines - Anti-infectieux	- Gammaglobulines - Vaccination
ULTATS	Très bien	Non revu	Non revu

RVATION	N° 31	N° 32	N° 33
	ADA... Catherine	BOI... J. Luc	BIZ... Patrick
	4 ans	2 ans	19 ans
	F	M	M
DIAGNOSTIC CLINIQUE	Rhino-trachéo bronchites à répétition	- Acné pustuleuse - Angines	Acné pustuleuse
STREPTOCOCCUS			12 U. TODD
STAPHYLOCOCCUS			
HEMAGGLUTINATION			anti-A 1/32 anti-B 1/64
PROPHYLAXIS	13,5 %	17 %	15 % - - 10 g/l
IMMUNO-ELECTROPHORESE ou DIFFUSION		IgA: 29 mg/100 ml IgM 75 mg/100 ml IgG: 620 mg/100 ml	
Traitement	- Gammaglobulines - Anti-infectieux	- Gammaglobulines	- Gammaglobulines
STATUT	Non revu	Amélioration depuis 2 mois	Non revu

ERVATION	N° 34	N° 35	N° 36
	BAS...Jean	BAT...Frédéric	ABE...Serge
	4 ans	4 ans	27 ans
	M	M	M
DIAGNOSTIC	Rhino-trachéo- bronchites récurrentes	- Prurigo - Asthme	- Rhinite obstruc- tive - Bronchites
STREPTO	250 U.TODD	12 U.TODD	
STAPHYLO		0,5 U.I./ml	
HEMAGGLU- LINE		anti-B I/I28	
PROTEIN	14,5 % - - 10 g/l	15 % - - 9,5 g/l	11 % - - 6,5 g/l
IMMUNO-ELEC- TROPHORES ou DIFFUSION	IgG: normales IgA: abaissées IgM: normales		
TRETEMENT	- Gammaglobulines	- Gammaglobulines - Broncho-dilata- teur	- Gammaglobulines - Vaccination - Antibiotiques
EVOLUTION	Bien depuis 1 an	N'a plus de crise depuis 7 mois	

Observation	N° 37	N° 38	N° 39
	AUB...marcel	ALL...Noël	BAR...Lucie
	30 ANS	49 ans	54 ans
	M	M	F
STREPTO			
STAPHYLO			
AGGLUTININE			
DIAGNOSTIC	- Asthme	Epidermite	- Asthme
CLINIQUE	- Rhinite spasmodique	infectieuse	- Bronchite chronique
PROPHYLAXIE	I2,5 % - - 8 g/l	I4 % - - 7,5 g/l	I3,5 % - - 8,5g/l
PHOTODIAGNOSTIC			Normale
TRAIITEMENT	- Gammaglobulines - désensibilisation	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Antibiotiques
STATUT	non revu	Très bien depuis 6 mois	Bien depuis 6 mois N'a plus de corticoïdes.

EVOLUTION	N° 40	N° 41	N° 42
	HUS...Alain	HOS...Hélène	BAR...Marcel
	13 ans	22 ans	54 ans
	M	F	M
DIAGNOSTIC	Asthme Dermite eczéma- tiforme	Furoncles récidivants	- Asthme - Bronchites à répétition
TRAITEMENT			100 U.TODD
STAPHYLO			0,08 U.I./ml
AGGLU- TATION			anti-B 1/8
PROPHO-	13,5 % - - 9,5 g/l	15 %	14 % - - 7 g/l
CO-ELEC- TRORESE ou IONISATION		IgG diminuées IgA très diminuées	
TRAI- TEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- tion	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Anti-infectieux
STATUT	Non revu	Evolution favora- ble après 2 mois	Non revu



OBSERVATION	N°43	N° 44	N° 45
	AUG...Roger	BIE...Roland	PRU...Jacques
	23 ans	41 ans	7 ans ½
	M	M	M
CLINIQUE	Rhumatisme articulaire aigu	Furonculose	Asthme
SÉROLOGIE	166 U. TODD	125 U. TODD	
ANTIPHYPHLO		2 U.I./ml	
AGGLUTINATION		anti-A 1/64 anti-B 1/16	
PROTEINURIE	II % - - 9 g/l	12 % - - 8 g/l	II % - - 7,5 g/l
IMMUNO-ELECTROPHORÈSE ou DIFFUSION	IgM diminuées	IgG:850 mg/100 ml IgA:455 mg/100 ml IgM:150 mg/100 ml	
TRAITEMENT	Gammaglobulines	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines
STATUT	Non revu	Amélioration 2 mois après	Non revu

ERVATION	N°46	N° 47	N° 48
	BRA...Elisabeth	CHA...Marguerite	CHA...X
	55 ans	66 ans	27 ans
	F	F	F
DIAGNOSTIC	- Polyarthrite rhumatoïde	Parkératose psoriasisiforme	- Hyperhydrose
CLINIQUE	- Rhino-pharyn- gites réci- divantes		- Dermite de contact
ASTREPTO	50 U.TODD	12 U.TODD	
STAPHYLO			
HEMAGGLU- LINE			
CTROPHO- E	13 % - - 8 g/l	15,5 % - - 9 g/l	12 % - - <u>8</u> g/l
UNO-ELEC- PHORESE ou FUSION			
ITEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Désensibilisa- - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Protéolysat
ULTATS	Amélioration	Amélioration	Non revu

ERVATION	N°46	N° 47	N° 48
	BRA...Elisabeth	CHA...Marguerite	CHA...X
	55 ans	66 ans	27 ans
	F	F	F
GNOSTIO	- Polyarthrite rhumatoïde	Parkératose	- Hyperhydrose
NIQUE	- Rhino-pharyn- gites réci- divantes	psoriforme	- Dermite de contact
STREPTO	50 U.TODD	12 U.TODD	
STAPHYLO			
HEMAGGLU- LINE			
CTROPHO- E	13 % - - 8 g/l	15,5 % - - 9 g/l	12 % - - <u>8</u> g/l
UNO-ELEC- PHORESE ou FUSION			
TEMENT	- Gammaglobulines - Désensibilisa- - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Désensibilisa- - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines - Protéolysat
ULTATS	Amélioration	Amélioration	Non revu

RVATION	N° 49	N° 50	N° 51
	CHA...François	CAR...Georgette	TAR... Claude
	31 ans	63 ans	11 ans
	M	F	F
NOSTIC IQUE	Psoriasis	PARAkératose infectieuse	Rhinite
STREPTO		12 U.TODD	
STAPHYLO		1,33 U.I./ml	
EMAGGLU- NE		anti-A 1/16 anti-B 1/8	
TROPHO-	14 % - - 7 g/l	17 % - - 10,5 g/l	13 % - - 9 g/l
NO-ELEC- HORESE ou USION			
TEMENT	- Gammaglobulines - Protéolysat - Soins locaux	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie	- Gammaglobuline - Vaccinothéra- pie
LTATS	Aucun	Amélioration	Non revu

ERVATION	N° 52	N° 53	N° 54
	LEP...Joël	GEN...Bénédicte	LEF...Armandine
	II ans	II ans	58 ans
	M	F	F
DIAGNOSTIC CLINIQUE	Furoncles récidivants	Bronchite asthmatiforme	Dermite eczématiforme
TEST STREPTO		100 U.TODD	12 U.TODD
TEST STAPHYLO		3 U.I./ml	0,75 U.I./ml
HEMAGGLUTI- LINE		anti- B I/4	anti-A I/16 anti-B I/8
ECTROPHO- E	13.8 % - - 10,8g/l	15,5 %	16,5 % - - 11,2g/l
UNO-ELEC- PHORESE ou FUSION		IgG:320 mg/100ml IgA: 90 mg/100ml IgM:108 mg/100ml	
TRAITEMENT	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie	- Gammaglobulines	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie
RÉSULTATS	Aucune poussée de furoncles depuis le trai- tement.	Observation ré- cente, la mala- de n'a pas été encore revue	Observation ré- cente, la mala- de n'a pas été encore revue.

OBSERVATION	N° 55
NOMS	GUI...Patrick
AGE	20 ans
SEXE	M
DIAGNOSTIC CLINIQUE	Epidermite infectieuse
ANTISTREPTO	12 U.TODD
ANTISTAPHYLO	0,37 U.I/ml
ISOHEMAGGLUTININE	anti-A I/4 anti-B I/I6
ELECTROPHORESE	15 % - - 8,75g/l
IMMUNO-ELECTROPHO- RESE ou IMMUNO- DIFFUSION	
TRAITEMENT	- Gammaglobulines - Vaccinothérapie
RESULTATS	Observation ré- cente, le mala- de n'a pas été encore revu.

RESULTATS APRES UNE THERAPEUTIQUE SPECIFIQUE
PAR GAMMAGLOBULINES

- - - - -

Devant tout syndrome de carence en immunoglobulines, le traitement ne peut être que substitutif par injections de gammaglobulines humaines.

Les résultats sont excellents dans l'ensemble, sauf dans les agammaglobulinémies Swiss Type, où la carence en anticorps circulants est associée à un déficit immunitaire cellulaire.

Dans ces cas là, la mort survient au décours d'affections virales ou mycosiques.

Des greffes de thymus ont été essayées aux Etats-Unis et en Suisse, mais se sont soldées par des échecs.

Dans les hypogammaglobulinémies secondaires (myélome, maladie de Waldenström, leucémie chronique), les résultats sont aussi bons que dans les formes idiopathiques.

La posologie est de 50 à 100 mgr/Kg à 16,5 %.

Le rythme d'injection est de toutes les trois semaines puisque la demi durée de vie des gammaglobulines n'est que de 20 jours.

Ceci exige donc une quantité importante de gammaglobulines: 40 à 50 ml par voie intra-musculaire.

Cette voie présente des inconvénients puisque l'injection va provoquer douleur et irritation locale (dus au volume injecté), mais également une protéolyse partielle par les enzymes musculaires.

Recemment, on a pu utiliser la voie veineuse. Cette voie déterminait auparavant avec les gammaglobulines standards des chocs anaphylactoides, essentiellement chez les sujets agammaglobulinémiques, en rapport avec la grosseur des agglomérats.

La gamma-veinine, produite par digestion enzymatique et production de fragments de gammaglobulines, était bien supportée par voie veineuse, mais éliminée par les urines.

C'est à Isliker (Croix Rouge Suisse), que nous devons la mise au point d'une gammaglobuline traitée par acidification à pH 4, non éliminée par les reins, non anticomplémentaire.

Cette variété de gammaglobuline peut être administrée par voie veineuse, de préférence en milieu hospitalier sans avoir donné les risques de choc anaphylactoides.

En ce qui concerne nos sujets:

- 32 seulement d'entre eux ont été régulièrement suivis,
- les doses administrées ont varié entre 25 et 50 mg/kg
- nous avons enregistré:
 - 6 résultats excellents,
 - 24 résultats satisfaisants,
 - 2 résultats nuls.

C O N C L U S I O N S

= = = = =

Les syndrômes de carence en anticorps posent un problème pour tout clinicien. Ils seront évoqués devant tout syndrome infectieux récidivant après antibiothérapie ou résistant à ceci. L'ensemble de ce travail a comporté trois parties:

Dans la première, nous avons exposé:

A- Les immunoglobulines à activité anticorps

Il en existe Cinq types:

- | | | |
|-------|-------|-------|
| - IgG | - IgA | - IgE |
| - IgM | ± IgD | |

Elles sont essentiellement constituées par l'association de deux chaînes protéiques lourdes et deux chaînes protéiques légères, sauf pour les IgM dont le nombre des chaînes est supérieur à celui des 4 autres variétés: ces immunoglobulines diffèrent par leurs propriétés physico-chimiques, antigéniques, les chaînes lourdes ayant des déterminants antigéniques spécifiques, tandis que les chaînes légères sont identiques à toutes les variétés d'immunoglobulines et ont des déterminants de type Kappa ou lambda, enfin des différences allotypiques.

L'IgG est l'immunoglobuline la mieux connue; le papain la divise en deux fragments Fc et F(ab)2; jouant un rôle dans la fixation cellulaire de l'IgG et F(ab)2 et les deux sites anticorps formés par les parties variables de la chaîne lourde et d'une chaîne légère, réunies entre elles par des ponts disulfures.

L'IgE de découverte très récente représente les anticorps réagins responsables de l'hypersensibilité immédiate.

Si l'on considère l'évolution normale des immunoglobulines chez le fœtus et le nouveau-né, nous savons que les IgG

à la naissance sont essentiellement d'origine maternelle. Ces IgG maternelles vont diminuer progressivement jusqu'à l'âge de 3 à 6 mois, âge à partir duquel l'enfant synthétise ses propres immunoglobulines.

Les IgM et les IgA ne traversent pas le placenta et sont en pratique synthétisés très progressivement par l'organisme de l'enfant.

- B - Les déficits immunitaires.

Ils peuvent être de deux types: congénitaux ou acquis.

Le déficit peut être global (humoral et cellulaire) ou sélectif (humoral ou cellulaire).

I) Les déficits immunitaires primitifs comprennent:

- les déficits humoraux,
- les déficits humoraux et cellulaires.

a) parmi les déficits humoraux, nous connaissons:

- l'agammaglobulinémie liée au sexe: maladie de Bruton qui se caractérise par une atteinte exclusive du système producteur d'immunoglobulines. L'immunité cellulaire est intacte.
- les agammaglobulinémies non liées au sexe qui sont congénitales.
- les déficits dissociés: l'immunoglobuline décelée uniquement par l'électrophorèse et que l'on observe dans les deux sexes. Plusieurs types:
 - Type 1, lié à une absence d'IgA.
 - Type 2, caractérisé par un déficit en IgM ou IgA.
 - Type 3, qui est le plus fréquent et qui relève d'un déficit en IgG et IgA, avec une augmentation des IgM.
 - l'hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson qui traduit un retard de maturation du système immunitaire, dure deux et cinq mois et qui peut se prolonger jusqu'à 9 mois.

b) parmi les déficits portants sur l'immunité humorale cellulaire, nous avons décrit:

- l'athymolymphoplasie de Glanzmann et Riniker; elle associe une agammaglobulinémie, une lymphopénie et une absence de réaction d'hypersensibilité retardée à la tuberculine; son pronostic est fatal; la mort survient par infections virales ou mycosiques.
- la lymphoplasie thymique: le tableau est identique à celui de l'athymolymphoplasie, mais la transmission ne touche que les garçons.
- le syndrome de Robert Good associe agammaglobulinémie et thymome.
- le syndrome de WISKOTT-ALDRICH se traduit par trois groupes de signes cliniques: hémorragiques, cutanés et infectieux; l'évolution est mortelle dans un délai de deux ans.
- la dysgénésie réticulaire est caractérisée par une lymphocytose et agranulocytose.
- le syndrome de GIBBLING (lymphopénie primitive).
- l'ataxie téléangiectasie (maladie héréditaire) et à transmission autosomique récessive).

2) Les déficits immunitaires secondaires, en rapport avec un catabolisme exagéré et une déperdition périphérique ou une diminution de synthèse des immunoglobulines.

Parmi les déficits portant sur la synthèse des gammaglobulines, on peut citer la maladie de Hodgkin, les gammopathies monoclonales, les néoplasies lymphoprolifératives.

Parmi les déficits secondaires à une augmentation du métabolisme, on retiendra l'hypoprotidémie hyper catabolique familiale idiopathique, la dystrophie myotonique, le syndrome de Sjögren.

Parmi les hypogammaglobulinémies secondaires à une déperdition excessive, on trouve essentiellement le syndrome néphrotique et le syndrome de type sprue.

DANS LA DEUXIÈME PARTIE, nous avons évoqué les principaux éléments du diagnostic biologique et la conduite pratique de ce diagnostic.

Parmi les méthodes explorant les déficits humoraux, retiendra:

I) l'étude des titres:

- a) antistreptolysines: inférieur à 20 U.TODD dans syndrome de carence en immunoglobulines.
- b) antistaphylolysines: inférieur à 2 U.I/ml.
- c) isohémagglutinines naturelles du groupe sanguin système A B O), soit nul, soit inférieur à 1/32.

2) l'électrophorèse: à la recherche d'une diminution des gammaglobulines.

A la suite de ces investigations, nous nous trouvons en face de deux possibilités:

- les titres et l'électrophorèse sont diminués et confirment l'impression clinique.
- les titres et l'électrophorèse sont normaux, les investigations seront complétées par des examens de spécialités: immuno-électrophorèse qui présente l'avantage d'étudier la précipitation des immunoglobulines avec un anti-sérum total ou avec un anti-sérum spécifique, mais les réponses ne sont que qualitatives. où l'intérêt de l'immunodiffusion de Mancini, les résultats sont quantitatifs.

Pour explorer les déficits cellulaires, on étudiera la numération formule sanguine et surtout la numération des petits lymphocytes. On pratiquera une radiographie de la région thymique, mais surtout la répose cellulaire in vitro par le test de transformation lymphoblastique: les lymphocytes en culture sont mis en

ésence de tuberculine et de phytohémagglutinine à différentes concentrations. A ces différents examens paraclinique, on peut ajouter la biopsie rectale et ganglionnaire, l'étude familiale enfin l'étude du cariotype.

LA TROISIEME PARTIE, comporte l'étude personnelle.

Nous avons étudié essentiellement le déficit immunitaire humoral chez 55 de nos malades qui avaient des réactions tuberculiniques (intra-dermo réaction à 3 U.) dans la majorité normales.

L'étude comparative s'est faite de la façon suivante.

- Etude comparative des titres, de l'électrophorèse, de l'immuno-électrophorèse et de l'immuno-diffusion de Mancini:

- 29 de nos malades présentaient une diminution des gammaglobulines à l'électrophorèse: de moins de 1/3 dans 25 cas et inférieure à la moitié dans 4 cas.

- sur 16 observations, la comparaison entre les trois titres et l'électrophorèse a été concordante chez 7 d'entre eux et discordante chez 9 autres sujets: les titres étant normaux et l'électrophorèse abaissée dans 6 cas et les titres étant abaissés et l'électrophorèse normale dans 3 cas.

- l'étude comparative de l'électrophorèse et de l'immuno-électrophorèse et de l'immuno-diffusion de Mancini a pu être pratiquée chez 5 malades:

- dans un cas, électrophorèse et immuno-électrophorèse étaient concordantes.

- dans deux cas, malgré une électrophorèse normale, l'immuno-diffusion de Mancini a confirmé le déficit immunitaire humoral.

- enfin, dans deux cas, l'immuno-électrophorèse n'a pas permis d'apprécier la diminution des immunoglobulines et n'a pu confirmer la diminution des gammaglobulines à l'électrophorèse.

- les deux étapes du diagnostic biologique ont pu être appliquées à 5 autres sujets:

- dans le premier cas, les titres et l'électrophorèse étaient normaux, seule l'immuno-diffusion de Mancini a confirmé le diagnostic.
- dans le deuxième cas, les titres étaient normaux, mais l'électrophorèse abaissée: la diminution des gamma-globulines a été confirmée par l'immuno-diffusion de Mancini.

Si nous considérons le sexe et l'âge de nos sujets, le syndrome de carence en anticorps semble plus fréquent chez les hommes et en particulier chez les adolescents et les adultes.

Selon le syndrome clinique, les déficits immunitaires étaient fréquents dans les syndromes respiratoires et en particulier dans l'asthme.

Dans les syndromes cutanés, le syndrome de carence en anticorps était plus fréquent dans les eczémas infectieux et les acnés pustuleuses.

LES RESULTATS

Le traitement des déficits immunitaires humoraux est surtout substitutif par les GAMMA-GLOBULINES HUMAINES.

La posologie doit être importante: entre 50 et 100 g/kg à 16,5 %. Les doses sont donc importantes: 40 à 50 ml par voie intra-musculaire.

Cette posologie élevée est à l'origine de douleurs d'irritation locale et peut également provoquer une protéolyse

se partielle par les enzymes musculaires.

Des essais par voie veineuse ont entraîné des chocs anphylactoides relevant de la grosseur des agglomérats et de l'action anti-complémentaire de ces agglomérats.

La gamma-veineuse était bien supportée et non éliminée par les reins, mais devra être administrée par voie veineuse en milieu hospitalier, étant donné les risques de choc anaphylactoïde.

32 de nos sujets ont pu être régulièrement suivis.

La posologie de gamma-globuline a varié entre 50 et 100 mgr/kg.

Les résultats ont été excellents dans 6 cas,
satisfaisants dans 24 cas,
nuls dans 2 cas

- - - - -

B I B L I O G R A P H I E

=====

BIBLIOGRAPHIE

- LEN G.E. - Congénital hypogammaglobulinémie with stéatorrhoea in two adult brothers. (Brit; Méd. J. 1964, 486, 5407).
- ON E., VARGUES R., GROUSSIN P., MICHON J. - Les agamma et hypogammaglobulinémies. (Presse Médicale 1963, 71, N° 54, 2.625 - 2.627).
- ONE., VARGUES R., GROUSSIN P., MICHON J. - Clinique moderne: équilibre protéique. Les agamma et les hypogammaglobulinémies. (Gaz; Méd. 1964, 136, N° 29, 1245).
- OCUAL J. - Syndromes de carences immunitaires et pathologie thyroïdienne. (Vie Méd. 48, Spécial I, mars 1967, 97-102).
- RDIER A. - Quoi de neuf en pédiatrie? (Rev. Prat. 1968, 18, (31bis) 68-75).
- CART. - Syndrome de carence immunitaire de l'enfant. (G.M. de France tome 76, N° 4, 5/II/69, P.741).
- RNIER J.J., FOUPE J. - Les immunoglobulines. (Conc. Méd. 29/4/67, 9-17, P. 3315-3318).
- RTAL Mohammed. - Les agammaglobulinémies et leurs manifestations respiratoires. (Thèse Toulouse 1967).
- EGEL A.A. et KRUMMOLZ R.A. - An immunoglobulin abnormality in pulmonary emphysema. (Amer. Rev. Resp. Dis. 1968, 97 (217)).
- MAHAM, FARHAT Mme, BOUJNAH A. - A propos d'un cas d'agammaglobulinémie. (Tunisie Méd. 1964, 42 N°1).
- RTIN P., BUFTE D. et GRABAR P. - Les hypogammaglobulinémies atypiques. (Ann. Inst. Past. 1964, 106, 519).
- BANEL C., VOOG R., STEFANI D., GROSLAMBERT P., MARCHAL A. - Polyarthrite rhumatoïde de l'adulte révélatrice d'une agammaglobulinémie. (Sem. Hop. Paris, 26/II/69, P.3034).
- ET J. - Les syndromes de carence immunitaire chez l'enfant et leur traitement. (G.M. de France, tome 75, II, 15/4/68, P.2293);
- LIER J., HUMBERT L. - Un cas d'agammaglobulinémie. (Rev. Méd. de Pédiatrie, 1960, 15, 137).
- RTAL J. - Déficit en immunoglobulines globaux dissociés et isolés. Autropénie cuticulaire. Déficit en IgA et ataxie téléangiectasie. (Gaz. Hop., 1966, 138, (27), 1268-1271).

- HAPTAL J. - Déficits des moyens de défense anti-infectieux chez l'enfant. Déficits en immunoglobuline globaux dissociés et isolés. (Ext.Conc. Méd. 1967, 89, 9, 1730).
- HARACHE P., ROSEN F.S., SANEW C.A., CRAI J.M., ROSENBERG H.A. - Acquired agammaglobulinemia in siblings. (Lancet, 1965, I, 234).
- LEMENT R. - Maladies par absence d'immunisation chez l'enfant. (Pres.Méd. 75, N° 5, 28/I/67, P.229-230).
- ORDELIER. - Ig Cordelier.
- ESSET H.B., PERRIN D. - Les carences en immunoglobulines par hypo et agammaglobulinémie. Notions actuelles. (J.Méd.Nantes, 1967, 7, P.281).
- OTTALORDA B. - Agammaglobulinémies de l'adulte et infections respiratoires. (Thèse Lyon, 1963 N°194).
- ROIZAT P., CREYSSSEL R., PONCET J. - Les carences acquises en anticorps (Gaz.Méd. de France, Tome 76, N°4, 5/II/69, P.729).
- RUCHAUD A., LAPERROUZA C., DUMMITAN S.H., PERRIER P.E. - Agammaglobulinemia in one of two identical twins). (Amér.J.Méd. 1966, 40, I, 127).
- ALOUS A. - Les carences en immunoglobulines. Actualités médicales récentes de quelques maladies infectieuses. (Ens.Post-Univers. de la Fac. Méd., séance du 21/2/68).
- UAUCHY F. - Anomalies héréditaires de la synthèse des molécules propres plasmatiques. (Gaz.Méd. de France, T.76, N°5, 25/I/69, P.553).
- AVIS N. - The immunoglobulin in health and disease. (J.S.C.Méd.Ass. 1968, 64/II, P.457).
- ELLELIS R. - The gamma system pathology therapeutics. (Postgrad Méd. J. 1969, 45/520, P.116).
- ELLE SANTA L. et FALORNIA. - Hypogammaglobulinémie et bronchectasie. (Minerva Péd. 31/3/67, 19, N°13).
- ELPECH B., BUFTE D., BURTIN P. - Les immunoglobulines humaines. (G.M. de France, T.76, N°4, 5/2/69, P.639).
- FOUR H. - Les bronchopathies chroniques de l'adulte dans l'hypogammaglobulinémie, à propos de 3 observations. (Thèse Paris, 1968).
- ROUX A. - Les manifestations broncho-pulmonaires des agammaglobulinémies. (Cah.Coll.Méd.Hop. 1966, 7, N°9).
- VENNEC F. - Intérêt actuel des gammaglobulines dans le traitement des maladies allergiques. (Ouest Médical, N°8, 25/4/70, P.901-905).

- ISHER D., HARTLEY B., LASECKER C., FORSTER E. - Lobectomie pour sup-
puration bronchopulmonaire chez un enfant atteint d'agammaglobuli-
némie congénitale et soumis à un traitement substitutif continu.
Résultats favorable maintenu après 3 ans. (J. Fr. Méd. Chir. Thor.,
Janvier 1966, 20, N°1).
- RANCOIS R. - Déficit dissocié en immunoglobuline et insuffisance
surrénalienne. Association possible d'une carence immunitaire et
d'une affection auto-immune. (Ann. Péd. 1967, 14, (II), P. 750-756).
- RANCOIS R. - Les agammaglobulinémies. (Méd. Inf. 1967, 74, 7, P. 559).
- REI P.C. - Application pratique de la notion de carence en anti-
corps. (Hop. Rothschild, Commun. Centre d'Allergie, Pr R. WOLFROMM).
- REI P.C. - Agammaglobulinémie et polyallergie. (Schweiz Méd. Wch.,
1967, 97/44, P. 1460-61).
- REYCOU F. - Les déficits en immunoglobulines et leur traitement.
(Cah. Méd. Lyonnais, 1966, 42, (12), P. 871-887).
- UDENBERG H. - Humanantidoties to IgA. (Immunochemistry, 1968, 5/24
P. 203-206).
- ADJOS A. - La biochimie des immunoglobulines. (Presse Méd. 77 N°4,
22/1/69, P. 137; 77, N°9, 19/2/69, P. 329).
- ADJOS A. - L'effet du sexe sur le taux plasmatique des immunoglo-
bulines.
- ADRAT J., MONNIER J., DECAUDE A., FEDOU R. - Agammaglobulinémie de
l'adulte avec splénomégalie, (examen de la rate au microscope élec-
tronique). (J. Fr. Méd. Chir. Thor. 1966, 20, 2, P. 223-227).
- ALY P. - Les pneumopathies par troubles immunologiques. (Poumons et
Coeur, 1967, 23, N°9).
- ALY P., BRUNE J. et Coll. - Bronchopneumopathies récidivantes par
agammaglobulinémie de l'adulte. (Lyon Méd. 1963, 210, P. 789-806).
- ALY P., BRUNE J. et Coll. - Agammaglobulinémies de l'adulte révé-
lées par des manifestations respiratoires. A propos de 4 observations.
(Bul. Mém. Soc. Méd. Hop. Paris, 1964, 115, 7, P. 639-649).
- UDIER B., PONTE C., NUYTS J.P., DELMAS-MARSALET Y., RYCKEWEART Ph. -
Retard de maturation des globulines immunes. Confrontation biolo-
gique et histologique sur une observation. (Pédiatrie T. XXII, N°5,
P. 569-575).
- ERMAIN D., CREYSSEL R. - Métabolisme des immunoglobulines. (Cah.
Méd. Lyonnais, 1966, 42, (12), P. 859-869).

- OLEBIEWSKA H. - Immunoglobulin G of restricted electrophoretic mobility in certain sera. (Clin. Exp. Immun. 1967, 2/3, P. 275-283).
- OOD R.A., KELLY W.D., ROTSTEIN J., VARCO R.L. - Immunological deficiency diseases. (Progress in Allergy 1962, 6, P. 187).
- OOD R.A., MAZITELIO W.F. - Chest disease in patients with agammaglobulinemia. (Dis. Chest, 29, 9, 1956).
- OULLET Ph. - Structure des anticorps sériques. (Presse Méd. N° 23, 8/5/65, P. 1349 et N° 27, 29/5/65).
- UGLER E?, BARANDUN S. - Les manifestations pulmonaires du syndrome de carence en anticorps. (J. Fr. Méd. Chir. Thor. 1966, 20, 2, P. 201-205).
- HALPERN B. - Facteurs biologiques modifiant la synthèse des anticorps. (Presse Méd. 26/3/69, P. 539).
- ITZIG W.H., BODMER P. - Développement et troubles des fonctions immunologiques. (G.M. de France, T 76, N° 6, 25/2/69, P. 119).
- ONG R. - Office diagnostic of immunologic deficiency. (Minn. Méd. 1969, 52, P. 1465-1467).
- UNTKEY C. - IgA deficiency and rheumatoid arthritis. (Amer. Dis. Child, 1967, 113/4, P. 411).
- SRAEL-ASSELAIN R. et Coll. - Un cas d'agammaglobulinémie avec bronchiectasie et eczéma allergique. (Bul. Soc. Méd. Hop. Paris, 1960, 76, 513).
- ANEMAY C.A. - The immunological system of the child. (Arch. Dis. Child, 1966, 41/128, P. 366-374).
- ERKPATRICK Ch., SCHIMKE R. - Paternal immunoglobulin abnormalities in congenital hypogammaglobulinemia. (JAMA. 1967, 200, 2, P. 105-110).
- DUVALAINEN K. - Immunoglobulin in pediatric disorders. (Ann. Paediatr. Fenn, 1966, 12/2 P. 83-88).
- ECOQ E.-LINZ. R. - Taux sériques des immunoglobulines de vieillards atteints de maladies chroniques. (C.R. Soc. Biol. 1969, 163, 3, P. 815).
- ETONTURIER Ph. - Les aspects cellulaires des réactions immunitaires. (Gaz. Hop. N° 36, 31/12/69, P. 1029).
- VEQUE B. - Intérêt du dosage des immunoglobulines chez l'enfant. (Conc. Méd. 1969, 91, 21, P. 4485-4489).
- CHARD J., PAYSANT P., STREIFF F., RENARD M., MICHAUD C. - Agammaglobulinemia primitive de l'adulte avec splénomégalie. (Ann. Méd. Nancy, 1963, 2, P. 106).
- ISEAU G., MARCHAND J., MONCADE et MOLINARI - UN nouveau cas d'agammaglobulinémie, découvert à l'occasion de manifestations otologiques. (Ann. Oto-Laryngol. 1963, 80, N° 10-11, P. 913-915).

- ALVEZIN J., CONTE M., LAGENTE B., JAULIN P. - Sprue chez un agaamglo-
bulinémique. (Arch. Mal. App. Dig. 1959, 48, P. 504).
- NUEL Y., RICHARD G. - Moyen d'étude des immunoglobulines.
Cah. Méd. Lyonnais, 1966, 42, 12; P. 843-857).
- WAS C., BURTIN C. - Les immunoglobulines humaines. Structure; cla-
ssification. Introduction à la pathologie. (Rev. Prat. Avril 68, 18, II,
P. 1647-1655).
- SHAKA G., SELIGMANN M. - Les agammaglobulinémies. (E.P.U. 28, 18/5/68
P. 4257).
- YER A., NADIAR G. - Prévention des poyssées d'infection des bron-
chites chroniques par les gammaglobulines. (Sem. Hop. 44 Année,
P. 44, 26/10/68, P. 2690-2694).
- GUERS J., LAYSSOL M., DE BOISSEZON J.F., ALBOU D. - Agaamaglobuli-
émie et bronchectasies. (J. Fr. Chir. Thor. 1966, 20, 2 P. 165).
- GUERES J., LAYSSOL M. - Carence en globulines immunitaires et in-
fections récidivantes de l'arbre respiratoire. (L'Hopital, dédem-
bre 1966, N° 774, P. 855-872).
- KOL C., RENOUX M. - Deux nouvelles classes d'immunoglobulines.
Presse médicale N° 32, 1/7/67, P. 1649).
- NETTO E., RICCI C., LAVEZZARO G., QUAGLIA V. - Pneumopathie chroni-
que par déficit immunitaire. (Presse Méd. 76, N° 3, 20/1/68, P. III).
- RANGE F. - Hypogammaglobulinémie primitive de l'adulte. A propos
de 4 observations; (thèse Méd. Lyon, 1967, N° 51).
- ULINIER J., SERVANTIE X., MESNIER F. - Connaissances actuelles sur
les immunoglobulines. (J. Méd. Bordeaux, N° 10, octobre 1966, P. 1539).
- UGIEL C., LAPRESLE C. - Les carences immunitaires. (Rev. du prat;
XVII, N° 18, 21/6/67, P. 2567).
- MBERG M., SCOPPOLA K. - Uncas d'agammaglobulinémie "acquise" chez
une femme adulte. Considérations cliniques. (Policlinico (Se. Prat.)
7/10/67, N° 42, P. 1505-1515).
- MER J., CARCASSONNE Y. - Sur un cas d'agammaglobulinémie acquise
de l'adulte. (Marseille Méd. 1965, 102, N° 2, P. 129-131).
- EUPE J., MEYER B. - Les immunoglobulines chez le fœtus et le nou-
veau-né (Pat. Biol., Février 1969, Vol. 17, N° 3-4, P. 191-209).
- ELKONEN R. - Immunoglobulin deficiency syndroms (Nord Méd. 1969,
1/9 P. 265-272).
- ERNOD J., KERMAREC J. - Les agammaglobulinémies et leurs manifesta-
tions respiratoires. (Presse Méd. 1966, 74, N° 47, P. 2411-2416).

- 93 -
- VILLARD J.P. - Les aspects cellulaires de la synthèse des anticorps. (C.M.L. N°6, 13/2/70, P.423).
- PARTZ. - Cours d'immunologie du C.E.S. (Angers, Octobre 1970).
- SENBERG D. FRANCOIS R. - Les carences dissociées en immunoglobulines. (Lyon Méd. 1965, 51, P.1347).
- SENBERG D. et Coll. - Les carences dissociées en immunoglobulines. Méd. Inf. 1967, 74, 7, P.567-573).
- SENBERG D. et Coll. - Thérapeutique des carences en immunoglobulines. (Méd. Inf, 1967, 74, 7, P.573-580).
- BBAH A., JAHAN F., MARGUERIE C., MENARD E. - Etude des syndrômes de carence en anticorps. (A propos de 55 observations). (Ouest Méd. 3°A. N°9, 10/5/70, P.1011-1014).
- BBAH A., MENARD E. - Diagnostic biologique du syndrome de carence en anticorps: une observation. (Société de Pneumo-phthisiologie de l'Ouest, Séance du 25/10/70, C/H.U. d'Angers).
- INT PAUL B. CHASSAIGNE M. PATEREAU C. - Immunoélectrophorèse. G.M. de France, 2/10/60, P.3847).
- LOMON - Cours d'immunologie: Déficiences en anticorps et paraprotéinémies. (Angers, 10/4/70).
- HERRER J. - Traitement de la dilatation des bronches par les gammaglobulines. (La clinique, 1963, 58, P.584).
- HMITZS J. CARON J. CABANES J. JOLY C. SELIGMAN M. AUSSANNAIRE M. - Hypogammaglobulinémie profonde congénitale avec lymphopénie. Pres.Méd. 14/2/70, 78, N°8, P.377-379).
- LIGMAN M. - Les déficits congénitaux en immunoglobuline. (Cah. Coll. Méd. Hop. Paris, 1967, 8, 5, P.353-363).
- ELIGMAN M. - Les états de déficit immunitaire. (Pres. Méd. 1966, 74, P.1739).
- LIGMAN M. MESHAKA G. - Les déficits congénitaux en immunoglobulines. (Rev. Péd. 1966, 2, 4, P.227-242).
- LGMAN M. WEISBERGER C. - Perspectives thérapeutiques dans les déficits immunitaires primitifs graves. (Pres Méd. 78, N°8, 14/2/70, 387).
- IER R. HENRY M. - Caractères, propriétés et structures des immunoglobulines. (Cah. Méd. Lyonnais, Vol. 46, N°6, 13/2/70, P.417).
- HILL J.F. - Some relationships between serum immunoglobulin deficiency and infection in utero and in the early weeks of life. Péd. 1969, 74, P.1257-1260).

